

NATURA URBANA

Información de flora y fauna - #005



1. Chira, piñuela cabeza de medusa. *Tillandsia caput-medusae* (Bromeliaceae)

Es una planta epífita (que vive sobre otra planta) y no es parásita, más bien, se le llama planta atmosférica porque se alimenta de las partículas de polvo y agua que lleva el aire, por eso se les observa viviendo sobre cables eléctricos. Es una especie nativa de México y Centroamérica.



2. Vireo cabecigrís, yellow-green vireo. *Vireo flavoviridis* (Vireonidae)

Anida desde el sur de Estados Unidos hasta Centroamérica y migra hasta el noroeste de Suramérica. En Costa Rica se distribuye en ambas vertientes por debajo de los 1500 metros sobre el nivel del mar. Se alimenta principalmente de insectos, arañas y pequeños frutos o arilos de semillas como es en el caso del copey (*Clusia rosea*) y la uruca (*Trichilia havanensis*).



3. Planta de coral, jatropa, ruibarbo, coralbush. *Jatropha multifida* (Euphorbiaceae)

Subarbusto suculento y con savia lechosa tóxica; fácil de reconocer por el tallo abultado en la base. Crece en sitios con mucha luz y se multiplica por semillas. Nativa de México y el Caribe, introducida en muchos países tropicales y subtropicales. Se siembra en jardines como ornamental y para atraer mariposas y colibries.



4. Araña hilo de oro. *Nephila clavipes* (Nephilidae)

Es muy común observarla en postes del cableado eléctrico, donde controlan plagas de moscas, zancudos y polillas. La hembra es más grande y evidente que el macho. Se distribuye desde Estados Unidos hasta Argentina, en Costa Rica se encuentra desde 20 hasta 1500 metros sobre el nivel del mar, en ambas vertientes.

Creditos

Arte y Fotografía: Roberto Lugari Güell

Contenido científico: Gustavo Vargas Rojas, Daniel Martínez Araya
Santa Ana, Costa Rica. 2020

Patrocinan:

