


NATURA URBANA

Información de flora y fauna - #009



1. Pájaro ardilla, cucú, squirrel cuckoo.

Piaya cayana (Cuculidae)

Se distribuye desde México hasta Argentina y Uruguay. Se reconoce por su larga cola con rayas blancas y anchas y su cuerpo rojizo brillante; de ahí su nombre popular en Costa Rica. Se alimenta de insectos grandes como chicharras, grillos, avispas y orugas; ocasionalmente de arañas, lagartijas y frutos.



2. Veranera, flor de papel.

Bougainvillea glabra (Nyctaginaceae)

Planta trepadora con espinas, las flores son blancas y están cubiertas por hojas muy llamativas llamadas brácteas. Existen muchas variedades con brácteas blancas, amarillas, anaranjadas, moradas, rojas y rosadas. Se usa comúnmente en setos y arcos floreados. En la medicina popular, las hojas tiernas y brácteas se usan contra afecciones gastrointestinales y respiratorias. Es nativa de Brasil.



3. Flor de una noche. **Epiphyllum** spp. (Cactaceae)

Es un cactus que vive sobre los árboles (epífita); crece en los bosques húmedos y muy húmedos de Costa Rica. Puede tener flores blancas o rojas, muy llamativas y grandes, polinizadas por murciélagos. Su tallo carnoso acumula agua que le permite hacer una fotosíntesis especializada denominada CAM, para abrir sus estomas y hacer el intercambio gaseoso durante la noche. Es muy similar a la también cactácea llamada pitahaya.



4. Mosquero listado, bienteveo rayado, streaked flycatcher.

Myiodinastes maculata (Tyrannidae)

Se distribuye desde México hasta Argentina. Es un poco parecido a un pecho amarillo, pero con la parte inferior del pico de color rosado y el pecho crema y blanco rayado. En Costa Rica se encuentra principalmente en la vertiente del Pacífico. Se alimenta de insectos, lagartijas y frutos pequeños y carnosos.

Creditos

Arte y Fotografía: Roberto Lugari Güell.

Aporte Fotográfico: Ana Ugalde (Foto #3), Simone Antich (#4)

Contenido científico: Gustavo Vargas Rojas, Daniel Martínez Araya
Santa Ana, Costa Rica. 2021

Patrocinan:

