


NATURA URBANA

Información de flora y fauna - #013



1. Larva de vaquita o mariquita.

Coccinellidae (Coleoptera)

Muchas especies de esta familia de abejones, tienen un periodo larval corto y una vida adulta prolongada. Estas larvas son feroces cazadoras y muy ágiles; se alimentan de pequeños artrópodos, por lo que son considerados insectos controladores de plagas. Los adultos (mariquitas), también controlan plagas y además comen polen, néctar y hongos.



2. Cardenal veranero, tangara veranera, tangara roja migratoria.

Piranga rubra (Thraupidae-Cardinalidae)

Tienen un dimorfismo sexual marcado, siendo los machos rojos y las hembras oliváceas dorsalmente y café amarillentas ventralmente. Migran desde Estados Unidos y México hasta Centroamérica y noroeste de Suramérica. Se alimentan de insectos y pequeños frutos.



3. Lechuguilla, ebolo.

Crassocephalum crepidioides (Asteraceae)

Hierba anual (nace, crece, florece y muere cada año), introducida en Costa Rica, nativa de Asia y África. Crece en zonas alteradas donde pueden dominar el paisaje temporalmente; son polinizadas por abejas y mariposas. En algunos países consumen sus tallos y raíces, sin embargo, parece tener compuestos secundarios tóxicos para el ser humano.



4. Mariposa marinera. **Thisbe lycorias** (Riodinidae)

Se distribuye desde el sur de México hasta Colombia y Perú. En Costa Rica es algo común en la Meseta Central, donde vuela a la orilla de los bosquitos y pasa desapercibida cuando se posa debajo de las hojas. Se alimenta de néctar de las flores. Es depredada por aves insectívoras, lagartijas e iguanas. Las plantas hospederas de las larvas son del género Senna (chipilón, saragundí y candelillo).

Creditos

Arte y Fotografía: Roberto Lugari Güell

Contenido científico: Gustavo Vargas Rojas, Jesús Ugalde Gómez y Daniel Sanabria Q.

Santa Ana, Costa Rica. 2021

Patrocinan:

