

NATURA URBANA

Información de flora y fauna - #014



1. Bolsero norteño, bolsero de Baltimore.

Icterus galbula (Icteridae)

Es una especie migratoria, abundante entre los meses de setiembre a abril. Es más común en la vertiente del Pacífico, desde sus costas hasta 1500 metros de elevación. Se alimenta de néctar de flores de árboles como el poró, Guanacaste y jiñocuabe; así como, de pequeños frutos de árboles como el guarumo y el higuerón.



2. Planta de la gloria, tibuchina.

Tibouchina urvilleana (Melastomataceae)

Arbusto originario de Brasil, cultivado en zonas tropicales como arbusto ornamental, donde requiere mucha luz y agua. Tiene las hojas opuestas y una textura aterciopelada. Se reconoce por sus bellas flores que varían de color violeta a púrpura rosado. Se propaga bien a través de pequeñas estacas al inicio de la época lluviosa y con la ayuda de reguladores de crecimiento o enraizadores.



3. Azulilla de estanque, caballito del diablo azul.

Enallagma cyathigerum (Coenagrionidae-Odonata)

El macho es azul con celeste y la hembra con un tono más opaco o cafezusco. Durante el apareamiento, la hembra y el macho forman una rueda de apareamiento, dada por la inclinación de sus cuerpos a manera de espejo. Las larvas (llamadas ninfas), viven en el agua, en pequeñas lagunas y quebradas, se alimentan de pequeños animales acuáticos.



4. Mandarina. ***Citrus reticulata*** (Rutaceae)

Arbustos o arbolitos, con hojas brillantes, que, al observarlas contra la luz, se notan a simple vista los puntos translúcidos, que son glándulas que contienen aceites esenciales. Es originaria de las zonas tropicales de Asia. Los frutos, como la mayoría de los cítricos comestibles de esta misma familia (limón y naranja), contienen mucha vitamina C, flavonoides y aceites esenciales, de los que se extraen sustancias medicinales y para la perfumería.

Creditos

Arte y Fotografía: Roberto Lugari Güell

Contenido científico: Gustavo Vargas Rojas, Daniel Martínez Araya
Santa Ana, Costa Rica. 2021

Patrocinan:

